

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Rue Saint-Jean • B.P. 19 • 31131 BALMA CEDEX Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33

Abonnements: 61.24.70.30

PUBLICATION PERIODIQUE

Régisseur de Recettes D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES" CCP : 8618-62 Y Toulouse

I.S.S.N.: 0752-2053

ABONNEMENT ANNUEL:

220 F.

BULLETIN Nº 1 DU 21 JANVIER 1993

Les agents du Service Régional de la Protection des Végétaux vous adressent leurs meilleurs voeux pour 1993

<u>CEREALES</u>

<u>Stades</u> végétatifs

Quelques rares parcelles levées fin Novembre sont au stade tallage.

La première vague de semis du début Décembre varie de deux feuilles à début tallage.

Les semis effectués après le 20 décembre n'ont pas rencontré de conditions permettant leur levée.

JAUNISSE NANISANTE

Situation

. Capture de pucerons

Des vols de pucerons anormalement intenses ont été enregistrés du 17 au 24 décembre 1992 ; des vols plus limités ont suivi du 5 au 18 janvier 1993.

. Observations en parcelles

Toutes les parcelles levées avant le 25 novembre ont été contaminées de façon notable (5 % à 10 % de picds porteurs à ce jour).

Les populations présentes sur des levées intervenues après le 25 décembre sont plus irrégulières.

Préconisation

. <u>Parcelles levées avant le 1er décembre ayant reçu un traitement selon le bulletin</u> du 5 décembre

La protection réalisée sera suffisante.

. Parcelles levées entre le 1er décembre et le 25 décembre non protégées

Réaliser un traitement de toute urgence. Le climat actuel très favorable à l'activité des pucerons permettra des dégâts comparables à ceux observés en 1990.

. Parcelles levées après le 25 décembre

Une observation des parcelles est indispensable, une intervention doit être envisagée dans les situations dans lesquelles des pucerons seraient observés.

COLZA

<u>Stades</u> végétatifs Ils s'échelonnent du stade B (apparition de feuilles, formation de la Rosette) à C1, reprise de végétation.

CHARANCON DE LA TIGE

Situation

Les premières captures de Charançons ont été observées dans le courant de la semaine du 11 au 15 janvier 1993.

Prévision

Les pontes de femelles devraient intervenir prochainement si le temps doux actuel se poursuit.

Préconisation

Intervenir dès le début de la semaine du 25 au 29 janvier 1993 si les conditions climatologiques actuelles persistent durant encore plusieurs jours. Choisir un produit efficace contre le Charançon de la Tige (Cf. Fiche "Ravageurs du Colza" envoyée avec le Bulletin n° 16 du 2 octobre 1992).